

Masterlure® Multiespecie

DESCRIPCIÓN GENERAL E INSTRUCCIONES DE USO.

Masterlure® Multiespecie en gotero, contienen una kairomona destinada a atraer las principales especies de gorgojos que atacan granos y productos almacenados. Al integrar esta kairomona en una trampa, es posible establecer un sistema para detectar la plaga.

Cada gotero contiene atrayentes alimenticios para gorgojos: *Ahasverus advena*, *Lasioderma serricorne*, *Palorus ratzeburgi*, *Tribolium audax*, *Alphitobius diaperinus*, *Latheticus oryzae*, *Palorus subdepressus*, *Tribolium castaneum*, *Anthicus spp*, *Mezium americanum*, *Sitophilus granarius*, *Tribolium confusum*, *Carpophilus lugubris murray*, *Necrobia rufipes*, *Sitophilus oryzae*, *Trogoderma granarium*, *Cryptolestes spp.*, *Niptus hololeucus*, *Necrobia rufipes*, *Sitophilus zeamais*, *Trogoderma varibile*, *Dermestes lardarius*, *Oryzaephilus mercator*, *Stegobium paniceum*, *Typhaea stercorea*, *Glischrochilus quadrisignatus*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Stenolophus lecontei*, y otros gorgojos menores.

CONTENIDO DEL ENVASE: 8 trampas adhesivas, 1 gotero de plástico con Kairomona de 6 mL y 8 piezas de papel filtro.

RECOMENDACIONES DE MONITOREO:

1. Trampas: Retire el liner de la trampa adhesiva y con un guante coloque el papel filtro dentro del sistema de trapeo, aplique de tres a cuatro gotas de kairomona y espere a que se humedezca todo el filtro, proceda al armado de la trampa.
2. Colocación: Sitúe las trampas en áreas donde se sospeche o requiera monitorear la presencia de gorgojos, como despensas, almacenes, estibas o cerca de productos almacenados susceptibles.
3. Distancia: Coloca las trampas a una distancia razonable entre sí para una cobertura efectiva. La distancia recomendada para **2** esquemas:
 - a) Monitoreo para confirmación de presencia: 30 a 40 metros entre cada trampa.
 - b) Trampeo masivo: 20 a 25 metros entre cada trampa.

4. Monitoreo: Realiza la primera revisión a las 24 horas de iniciar con el monitoreo. Si no hay captura, revisiones periódicas de las trampas (de 7 a 14 días), esto proporcionará información sobre la actividad de adultos y la efectividad del control.
5. Periodo de Monitoreo: Una vez colocadas, realizar ajustes, dependiendo del grado de infestación. Para infestaciones bajas de 2 a 3 semanas. Para infestaciones altas o moderadas el monitoreo semanal es ampliamente recomendable.
6. Registro de Datos: Se sugiere llevar un registro de las capturas, incluyendo:
 - a) La cantidad y especie de adultos capturados
 - b) La frecuencia de revisión (semanal, quincenal, mensual, etc.).
 - c) Nombre, fecha y ubicación de trampa.

MANTENIMIENTO DE TRAMPAS:

Revise las trampas regularmente y reemplace las trampas adhesivas cuando se llenen de polvo o insectos.

ALMACENAMIENTO:

Mantener los septos lejos de la exposición directa a la luz solar, altas temperaturas, chispas y llamas. Guarda en frío (no menor a 4°C) para preservar durante un periodo aproximado de 12 meses o en un congelador (al menos -20°C) para extender su vida útil a 24 meses. Asegúrate de almacenarlo siempre sellado en su envase original.