

## FICHA TÉCNICA

**FIPROBEE®****Insecticida Urbano**

Concentrado Emulsionable

REG. RSCO-URB-INAC-0101A-X0027-009-2.87

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL****% en peso****INGREDIENTE ACTIVO:**

FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dicloro-  
 $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-*p*-tolil)-4-  
trifluorometilsulfinilpirazol-3-  
carbonitrilo .....2.87  
(Equivalente a 26.12 g de i.a./L a  
20°C)

**INGREDIENTES INERTES:**

Solvente y emulsificantes. ....97.13  
**TOTAL** .....100.00

**Categoría Toxicológica: Azul – Precaución****BEEVERT, S.A. DE C.V.**

Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918.

Tel.: (55) 5888-1339

contacto@preservemx.com

Web: [www.preservemx.com/our-brands/beevert](http://www.preservemx.com/our-brands/beevert)

**INSTRUCCIONES DE USO**

**FIPROBEE®** es un insecticida de efecto residual para aplicarse sobre grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, también puede aplicarse debajo de muebles, detrás de fregadores, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las plagas. Utilice **FIPROBEE®**, controla las siguientes plagas:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS
<b>Termitas:</b>		
Subterráneas	<i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Zootermopsis spp.</i> , <i>Heterotermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i>	2 L en 100 L para infestaciones normales
De la madera seca	<i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes spp.</i> <i>Kaloterme sp.</i>	4 L en 100 L para infestaciones severas
De nidos acartonados	<i>Nasutitermes spp.</i>	
<b>Cucarachas:</b>		
Germánica De bandas cafés Café Orienta Americana	<i>Blatella germanica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	60 mL en 10 L de agua
<b>Hormigas:</b>		
Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga del fuego Domestica Carpintera	<i>Pogonomyrmex sp.</i> <i>Solenopsis sp.</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp.</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Tapinoma spp.</i> <i>Camponotus spp.</i>	60 mL en 10 L de agua
<b>Otras plagas:</b>		
Moscas	<i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp.</i> , <i>Drosophila spp.</i>	10 mL/L de agua para infestaciones normales  20 mL/L de agua para infestaciones severas.  En aplicaciones totales: 1 L de mezcla es para 15 a 20 m <sup>2</sup> .
Mosquitos	<i>Culex spp.</i> , <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i>	
Avispas o véspidos	<i>Vesula spp.</i> , <i>Vaspa spp.</i>	
Pulgas	<i>Xenopsylla spp.</i> <i>Ctenocephalides spp.</i>	
Chinches	<i>Triatoma spp.</i> <i>Rhodnius prolixus</i>	
Chinche de cama	<i>Cimex spp.</i>	
Pescadito de plata	<i>Lepisma spp.</i>	
Grillo	<i>Acheta domesticus</i>	
Cochinillas	<i>Isopoda</i>	
Tijerilla	<i>Forticula auricularia</i>	
Alacranes	<i>Centruroides spp.</i>	
Arañas	<i>Latrodectus mactans</i> , <i>Loxosceles spp.</i>	
Ciempíes	<i>Quilopodos y diplopodos</i>	
Gorgojos	<i>Tribolium castaneum</i> <i>Sitophilus oryzae</i> <i>Trogoderma granarium</i> <i>Tenebroides spp.</i>	
Garrapatas	<i>Ixodidae</i>	

**FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones.

**TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS:** Dos horas o inmediatamente después de que el tratamiento haya secado.

### **MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **FIPROBEE**<sup>®</sup>, medida con ayuda de una probeta y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

### **CONTRAINDICACIONES**

No aplique **FIPROBEE**<sup>®</sup>, durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

### **INCOMPATIBILIDAD**

No aplique **FIPROBEE**<sup>®</sup>, durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN:** Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: overol impermeable de manga larga con capucha integrada, guantes de neopreno, goggles o lentes de seguridad, botas de neopreno y mascarilla provista de cartuchos contra vapores.

## Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Símbolo (s):



Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Indicaciones de peligro:

H301	Tóxico en caso de ingestión
H311	Tóxico en contacto con la piel
H315	Provoca irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
H330	Mortal si se inhala
H351	Susceptible de provocar cáncer
H361	Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto

**¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO!**